

- 2013, 17(46): 8012-8017.
- [2] 黄明炜, 廖勇敢, 李晓雯, 等. 补肾益骨方治疗2型糖尿病骨质疏松症疗效观察[J]. 现代中西医结合杂志, 2014, 23(13): 1397-1398.
- [3] 朱书涛, 刘洋, 张明辉, 等. 去卵巢大鼠骨组织中肿瘤坏死因子 α 、白细胞介素1 β 及白细胞介素6水平与骨质疏松的关系[J]. 中国组织工程研究, 2016, 20(15): 2206-2211.
- [4] 于伟利, 王世捷, 韩俊丽, 等. 辛伐他汀对骨质疏松大鼠的防治作用[J]. 西安交通大学学报, 2009, 30(5): 605-608.
- [5] 柴仪, 李倩, 刘法敬, 等. 补肾活血方对骨质疏松大鼠血清骨密度及血清标志物的影响[J]. 临床合理用药杂志, 2015, 8(7A): 69.
- [6] 回连强, 曹春雨, 刘婷, 等. 黔岭淫羊藿总黄酮对抗维甲酸致大鼠骨质疏松作用的研究[J]. 中国实验方剂学杂志, 2014, 20(3): 170-174.
- [7] 柴仪, 李倩, 田伟明, 等. 自拟补肾活血方对压缩性骨折椎体成形术后骨密度与功能的影响[J]. 中国药业, 2015, 24(3): 14-16.
- [8] 孙丽娟, 陈静. 雌激素替代治疗绝经后骨质疏松的疗效观察[J]. 中国临床康复, 2004, 8(18): 3450.
- [9] 那健, 许永, 马超, 等. 老年骨质疏松的分子生物学发病机制[J]. 中国老年学杂志, 2011, 10(3): 4070-4072.
- [10] 毛海琴, 杜义斌, 徐莹, 等. 骨质疏松颗粒对去卵巢骨质疏松大鼠骨密度及血清细胞因子的影响[J]. 环球中医药, 2015, 8(9): 1081-1084.
- [11] 李学朋, 孟照明, 孟兆亮, 等. 补肾活血方对去卵巢大鼠骨质疏松检测指标的影响[J]. 中国医学创新, 2013, 10(2): 16-18.
- [12] 黄智胜, 白艳甫. 补肾益气壮骨膏对绝经后骨质疏松症患者骨密度及细胞因子的影响[J]. 中医药导报, 2012, 18(3): 25-26.
- [13] 翟文. 大豆异黄酮对女性更年期综合征及骨密度的影响[J]. 中国妇幼保健, 2012, 27(21): 3318-3320.
- (收稿日期: 2017-12-28; 修回日期: 2018-01-22)

· 个案 ·

doi:10.3969/j.issn.1006-4931.2018.15.006

地榆升白片过敏样反应1例

林惠娥, 郑茹萍

(中国人民解放军第180医院药学科, 福建泉州 362000)

中图分类号: R288; R273

文献标识码: D

文章编号: 1006-4931(2018)15-0019-01

1 临床资料

患者, 女, 59岁, 因“左肩酸痛1年余”来我院就诊。门诊ECT扫描示: 全身多发骨转移, 门诊拟“多发性骨髓瘤”收住放疗科。此次入院为第1次化学治疗, 入院后给予VACD方案, 第1~4天给予酒石酸长春瑞滨注射液10mg, 多柔比星注射剂10mg, 环磷酰胺粉针剂200mg; 第1~4天及第9~12天给予地塞米松注射液20mg。与放射治疗同步, 昂丹司琼止吐, 奥美拉唑钠护胃, 胸腺五肽提高免疫, 增强治疗耐受等处理。入院后血常规检查示白细胞计数(WBC) $4.2 \times 10^9/L$, 化疗后查WBC ($1.9 \times 10^9/L$) 轻微下降, 给予地榆升白片(成都地奥集团天府药业股份有限公司, 批号为150403)400mg, 口服, 每天3次。大约1h后, 患者感皮肤瘙痒、胸闷不适、头晕乏力, 疑为地榆升白成分引起的过敏样反应, 立即停药, 并给予氯雷他定片10mg, 口服, 每晚1次, 静脉注射地塞米松注射液5mg、每日1次抗过敏处理。2h后, 患者诉瘙痒缓解, 胸闷不适、头晕乏力症状明显改善。次日晨起, 患者无瘙痒、胸闷不适、头晕乏力症状。因此, 考虑为地榆升白片引起的过敏样反应。此后, 患者未再使用该药, 直到出院也未再出现上述症状。

2 讨论

地榆升白片是一种由地榆单味药组成的纯中药制剂, 主要成分有皂苷、大黄酚、鞣质等, 具有健脾补肾、益气养血、活血化瘀的功效^[1]。其可减轻骨髓抑制程度, 刺激骨髓造血, 使造血细胞进入增殖状态, 促进分化^[2]; 还可调节T细胞亚群分布, 增加机体免疫力; 同时, 可升高骨髓有核细胞数, 保护骨髓造血细胞DNA免受损伤, 适用于白细胞减少症^[3]。

因其药品说明书中不良反应项为“尚不明确”, 查阅国内外文献, 也未见相关报道。此例患者口服地榆升白片后1h出现皮肤瘙痒、胸闷不适、头晕乏力, 停药后给予抗过敏治疗, 患者症状及体征迅速消失, 此后, 未再使用该药, 上述症状也未再出现, 故考虑为地榆升白片所致过敏样反应可能性较大。因此, 临床使用地榆升白片时应关注此类不良反应, 提高用药安全。

参考文献:

- [1] 龚建益, 段萍. 地榆升白片预防非小细胞肺癌患者化疗后白细胞减少症的临床疗效观察[J]. 临床合理用药杂志, 2010, 3(2): 25-26.
- [2] 赵泽丰, 何希瑞, 张强, 等. 地榆升白片治疗肿瘤化疗后引起的白细胞减少 Meta 分析[J]. 西北药学杂志, 2017, 32(5): 648-652.
- [3] 王秋红. 地榆升白片联合利血平在白细胞减少症治疗中的效果观察[J]. 中国社区医师, 2014, 30(16): 99.

(收稿日期: 2018-01-10)